

Az alábbiakban kiemelésre kerültek az 2021. május 7-én megjelent a Magyar Közlöny 22. száma Hivatalos Értesítőjében a III. Közlemények részben megjelent eljárásrend azon részei, ahol változás történt, továbbá, azok, melyeket ismételt hangsúlyozni szükséges:

## **2. Teendők a beteggel**

### **2.1.1. A járványügyi surveillance során alkalmazandó esetdefiníció**

*A KLINIKAI-, VALAMINT LABORATÓRIUMI KRITÉRIUMOK VÁLTOZATLANOK, DE AZ EPIDEMIOLOGIAI KRITÉRIUMOK KÖZÉ ISMÉT BEKERÜLT A KÖVETKEZŐ PONT:*

COVID-19 fertőzésre gyanús minden olyan személy, aki:

- Olyan területen járt vagy él, ahol a WHO weekly epidemiological report alapján fennáll a közösségi terjedés – <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports-community-transmission>

## **2.2. Elkülönítés**

**A gyanús és a megerősített eset elkülönítése kötelező**

*VÁLTOZÁS:*

- A gyanús eset megerősítéséhez elég az antigén gyorseszteszt pozitivitása is.
- Az elkülönítés (karantén) kezdete mostantól a mintavétel napja vagy, ha az nem egyezik meg a vizsgálatkérés (mintavétel kérése) időpontjával (mert pl. késik a mentő kiérkezése a mintavételre) a vizsgálatkérés időpontjától kell számolni a karantén 10 napját.

## **2.3. Diagnosztikus mikrobiológiai vizsgálatok**

*NINCS VÁLTOZÁS, DE A FIGYELMET SZERETNÉNK FELHÍVNI A KÖVETKEZŐKRE:*

SARS-CoV-2 Antigén (Ag) gyorseszteszt:

- pozitív eredmény → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés
- negatív vagy kétes/nem értékelhető eredmény → PCR

SARS-CoV-2 PCR vizsgálat:

- pozitív → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés
- negatív → ha a gyanú fennáll, előző mintavétel után legalább 48 óra múlva ismételt mintavétel

A SARS-CoV-2 PCR vizsgálatot végző laboratóriumok (mind az NNK által kijelölt, mind a többi, akár térítéses vizsgálatot végző laboratóriumok) kötelesek az általuk végzett vizsgálat eredményét – függetlenül annak pozitív, negatív vagy kétes minősítésétől – interfészen keresztül – feltölteni az OSZIR mikrobiológiai alrendszerébe.

## **SARS-CoV-2 antigén teszt alkalmazása esetén**

*A KÖVETKEZŐ FELADATRÓL RÉSZLETESEN KÜLÖN KÖRLEVÉLBEN TÁJÉKOZTATTUK A SZERVEZETI EGYSÉGEKET:* A SARS-CoV-2 antigén gyorsesztesztet

végző egészségügyi szolgáltatók kötelesek az általuk végzett antigén gyorseszteszt pozitív eredményét az OSZIR fertőző beteg bejelentő rendszerébe rögzíteni.

### **3. Teendők a beteg környezetében**

#### **3.3. Járványügyi megfigyelés:**

*AZ ELJÁRÁSRENDBE A KÖVETKEZŐK KERÜLTEK BE:*

- Azon személyek esetén, akik az elmúlt 6 hónapban igazoltan átestek koronavírus fertőzésen, járványügyi intézkedés nem szükséges.

- A COVID-19 beteg környezetében szoros kontaktnak minősített személy, aki védőoltásban részesült: Mentésül a karantén alól az a védőoltásban részesített személy, aki a védettségi igazolvány átvételének időpontját követően került szoros kontaktusba az igazolt fertőzővel.

*A FENTIEK ELLENÉRE INTÉZMÉNYÜNK SZIGORÚBB ABBAN A TEKINTETBEN, HOGY A KONTAKT BETEGELLÁTÓ SZEMÉLYZET ÚN. KONTAKT SZŰRÉSÉT (A 0. - 4. - 6. ILLETVE 10. NAPON VÉGEZVE) A FENTI ESETEKBEN IS FONTOSNAK TARTJUK.*

#### **4. sz melléklet**

**Laboratóriumi vizsgálat (SARS-CoV-2 PCR) céljából történő mintavételezés**

#### **3. SARS CoV-2 antigén kimutatására irányuló gyorseszteszt alkalmazása**

*A KÖVETKEZŐKET BE KELL TARTANI, DE A GYORSTESZT KAZETTA FOTÓDOKUMENTÁCIÓJA GDPR ÉRZÉKENYSÉG MIATT NEM JAVASOLT!*

- Az Ag gyorseszteszt alkalmazása esetén a gyorsesztesztkazettára rá kell írni a beteg nevét.

- A beteg egyik orrnyílásán keresztül a gyorseszteszthez mellékelt mintavevővel nasopharyngeális mintavételt kell végezni.

- A gyorseszteszt saját használati utasítása szerint szükséges elvégezni a vizsgálatot.

- A gyorseszteszt kazettáról a leolvasásával egyidőben fotódokumentációt kell készíteni olyan módon, hogy a fotódokumentáción is látszódjon, hogy melyik beteg mintájának vizsgálata történt meg a gyorseszteszttel. A fotódokumentációt a betegdokumentációban el kell helyezni.

- A beteg dokumentációjában le kell írni a gyorseszteszt vizsgálat időpontját és eredményét

- A nasopharyngeális pálcát a használat után veszélyes hulladékként kell kezelni.

#### **5.sz. melléklet**

**A betegek kórházból történő elbocsátásának, illetve az elkülönítés feloldásának kritériumai COVID-19 fertőzés kapcsán**

#### **1. Kórházban ápolt, megerősített COVID-19 beteg/fertőzött elbocsátásának kritériumai**

##### **1.1. A beteg hazabocsátásának, illetve más – nem COVID-19 betegek ellátását biztosító osztályra történő áthelyezésének feltétele**

*SZERETNÉNK A FIGYELMET FELHÍVNI ARRA, HOGY :*

A beteg kórházból való kibocsátásának idejét a beteg állapota határozza meg!

Amennyiben további fekvőbeteg ellátást nem igényel, kibocsátható (pl. legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek és/vagy a radiológiai kép a tüdőgyulladás egyértelmű javulását mutatja). Amennyiben a hazabocsátás a tünetek kezdetétől számított 10 napon belül történik, akkor otthonában a 10. napig elkülönítése szükséges.

A hazabocsátásról a járási hivatal népegészségügyi osztályát értesítenie kell a kibocsájtó orvosnak a [jarvany.nefo@csongrad.gov.hu](mailto:jarvany.nefo@csongrad.gov.hu) címen.

*VÁLTOZÁS:*

Egy SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorseszteszt vizsgálat negatív eredménye esetében a beteg gyógyultnak minősíthető (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését/VAGY ANNAK HIÁNYÁBAN A POZITÍV EREDMÉNYT követő 10. nap), és további elkülönítés nélkül otthonába bocsátható, illetve a COVID-19 fertőzöttek ellátására kijelölt osztályról/részlegről más osztályra áthelyezhető.

## **1.2. A beteg bentlakásos szociális intézménybe történő áthelyezésének, visszahelyezésének feltétele**

*VÁLTOZÁS: 1 DB GYORSTESZT IS ELEGENDŐ A SZOCIÁLIS OTTHONBA VALÓ HELYEZÉSHEZ A KÖVETKEZŐK SZERINT:*

COVID-19 fertőzésen átesett, de kórházi ellátást már nem igénylő, gondozott – amennyiben a tünetek megjelenését követő 21. nap még nem telt le – a szociális intézménybe áthelyezhető új ellátottként, vagy fennálló ellátotti jogviszony esetén, visszahelyezhető a szociális intézménybe. Az áthelyezést megelőzően egy SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorseszteszt vizsgálat szükséges és annak pozitivitása esetén a szociális intézménybe történt felvételtől, visszavételtől számított 10 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni az ellátottat.

COVID-19 fertőzésen átesett gondozott – a tünetek megjelenését követő 21. napon túl – SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorseszteszt vizsgálat nélkül egészségügyi intézményből áthelyezhető, visszahelyezhető a bentlakásos szociális intézménybe.

## **3. Egészségügyi intézményben nem COVID-19 fertőzés miatt ellátott beteg szociális intézménybe bocsátása**

*ITT IS AZ ELŐZŐ PONT SZERINTI VÁLTOZÁS ÉRVÉNYES:*

A fekvőbeteg ellátó intézmények esetében nem COVID-19 fertőzés miatt ellátott beteg esetén, ha a beteget legalább 48 órán át az egészségügyi intézményben ápolták/kezelték ezen melléklet 1.2. pontja szerint kell eljárni (Ag gyorseszteszt és 10 napos elkülönítés szükséges). Ennél rövidebb ápolási idő esetén intézkedés és/vagy laboratóriumi vizsgálat nem szükséges.

## **4. COVID-19 fertőzött, közvetlen betegellátásban résztvevő, egészségügyi dolgozók, szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás feloldása**

Amennyiben az egészségügyi/szociális dolgozó klinikailag gyógyult, vagy COVID-19

fertőzése tünetmentesen zajlott, akkor a munkavégzéshez (a közvetlen betegellátásban való részvételhez, közvetlen ápolási tevékenységhez) történő visszatérés feltétele 1 db SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorseszteszt vizsgálat negatív eredménye

**VÁLTOZÁS:** (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 10. nap).

6. sz. melléklet

## **INFEKCIÓKONTROLL ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK A BETEGELLÁTÁS SORÁN**

### **Részletes szabályok**

#### **2. A COVID-19 fertőzésre gyanús, valamint a valószínűsített és megerősített COVID-19 fertőzött személyek elkülönítése fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekben**

***VÁLTOZÁS NINCS, DE ISMÉTELTEN SZERETNÉNK FELHÍVNI A FIGYELMET E PONT LÉNYEGÉRE:***

Ne legyen egy kórteremben elhelyezve:

- a COVID-19 fertőzött tünetes személy
- a COVID-19 fertőzött, de tünetmentes személy
- a COVID-19 fertőzésre gyanús személy (még másik COVID-19 fertőzésre gyanús személlyel sem)!
- Kohorsz izoláció: A tünetekkel bíró, megerősített COVID-19 fertőzöttek kohorsz izolációja megengedett jól szellőző, lehetőleg komfortos szobában, de az ágyak egymástól való távolsága legalább 1,5 méter legyen és az ajtót csukva kell tartan.
- Amennyiben a humán erőforrás-kapacitás megengedi, a fenti külön kategóriába sorolható személyek ellátását külön-külön kijelölt személyzet végezze.

#### **5.1. Egyéni védőeszközök felvétele és levétele**

***VÁLTOZÁS:*** Nem szerepel benne, hogy „dupla” kesztyűt kell felvenni, tehát nem kell dupla kesztyűt hordani! Továbbá a who és cdc ajánlások sem támogatják a dupla kesztyű használatát (a vírus nem fertőz a bőrön keresztül és a dupla kesztyű használata akadályozza a kézhigiéne szabályainak betartását!)

#### **EGYÉB:**

***AZ ELJÁRÁSREND BEN NEM SZEREPEL, DE AZ ELEKTÍV ELLÁTÁSOK ÚJRAINDÍTÁSA MIATT SZERETNÉNK FELHÍVNI AZ ALÁBBIKRA A FIGYELMET:***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által május 6-án kiadott 10/2021. számú egyedi utasítása a rehabilitációs ellátások és az elektív beavatkozások újraindításáról témájú levélben az alábbi intézkedés olvasható:

- Az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátások és elektív beavatkozásra jelentkező betegek felvételének feltétele:

- hogy az egészségügyi állapotból adódó egyéb kontraindikáció nem áll fenn és
- érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek,

vagy

- védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek,
- de a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív SARS-CoV2-PCR teszt eredménnyel és
- a műtét napján végzett negatív Antigen gyorstesztel rendelkeznek.

A SZTE SZAKK által elektív formában ellátott fekvőbetegek esetén ezen túlmenően a betegek biztonságára érdekében **az oltatlan betegeken kívül azoknál a betegeknél is javasolt a tervezett beavatkozás/betegfelvétel előtt 48 belül a Sars-CoV2 PCR teszt, akik nem rendelkeznek a védettségi igazolványukat kiegészítő – mindkét oltás felvételéről szóló – igazolással.**

Az SZTE SZAKK klinikáin a fekvőbeteg ellátások igénybevételéhez - a betegek és a munkatársak biztonságára érdekében - továbbra is **javasolt a minden beteg felvételekor az antigén gyorsteszt szűrés, melyet az oltási státusztól függetlenül javasolt elvégezni.**

Az akut esetek ellátásakor az oltatlan, illetve a két oltás felvételéről szóló igazolással nem rendelkező betegeknél a felvételkor az antigén gyorsteszt elvégzése után, ha annak eredménye negatív, PCR vizsgálat is történjen. A PCR eredmény megléte azonban nem feltétele az egységek közötti betegátadásnak, azaz a negatív gyorsteszt eredmény birtokában a szakmailag indokolt átadás-átvételnek meg kell történnie.