

	<h1>Radiológiai Klinika</h1>	SB-RADI-03-T
Betegtájékoztató kontrasztanyag os ultrahang vizsgálathoz		<i>Változat: 01</i> <i>Kiadva: 2020.08.01</i>

Önt/gyermekét/gondozottját kezelőorvosa a panaszai illetve a betegsége pontos tisztázása, valamint a megfelelő kezelés megválasztása követése érdekében kontrasztanyag os ultrahang vizsgálatra küldte. A kezében tartott tájékoztató az Ön vizsgálatával kapcsolatos információkat tartalmazza. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, és ha bármilyen kérdése lenne, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

Általános tudnivalók: Az ultrahang vizsgálat korszerű képalkotó diagnosztikai vizsgáló módszer. A vizsgálat során egy vizsgálófejjel pásztázzuk végig a kérdéses területet. Amikor egy szerv működéséről vagy a szervben lévő elváltozások jellegéről pontosabb képet szeretnénk kapni, intravénás kontrasztanyag adása válhat szükségessé.

A vizsgálat előkészítése: A vizsgálat különösebb előkészítést nem igényel, kezelőorvosa egy vénás beviteli utat biztosít a kontrasztanyag beadásához.

A vizsgálat menete: A vizsgálat során a vizsgálóasztalon kell feküdni. A vizsgálat kezdetén egy „rutin” ultrahangot végzünk, majd a kontrasztanyag beadását követően átlagosan 5-10 percig nézzük a kérdéses elváltozást vagy szervet.

Lehetséges veszélyek, szövődmények és azok elkerülése, elhárítása: A kontrasztanyag klinikai vizsgálatai során tapasztalt legtöbb mellékhatás enyhe és átmeneti volt (fejfájás, hányinger, fájdalom, égő érzés vagy zsibbadás a beadás helyén).

Ritka mellékhatások: viszketés, kiütés, hasi, mellkasi vagy hátfájdalom, értágulat, vércukorszint emelkedés, homályos látás, torok irritáció, testrészek zsibbadása, szédülés, alvászavar, elgyengülés. Ezen enyhe mellékhatások spontán szűnnek. Bár igen ritka, de potenciálisan előfordulhat allergiás reakció. Nagyon ritkán alakulhat ki az úgynevezett anafilaxiás (túlérzékenységi) sokkos állapot, melynek elhárítására Intézetünk felszerelt és felkészült, a szükséges klinikai háttér biztosított.

Az ultrahang kontrasztanyag nem alkalmazható, amennyiben Önnek/gyermekének/gondozottjának a következő betegségei vannak:

- myocardialis infarktus (szívroham) és azóta is gyakori szív táji nyomó érzése/fájdalma van
- a közelmúltban szívkoszorúér beavatkozása volt
- az EKG-ja megváltozott a közelmúltban
- szívelégtelenségben szenved
- súlyos ritmuszavara van
- szívében jobb-bal shunt van
- súlyos mértékben emelkedett a tüdőartériák nyomása
- beállíthatatlan magasvérnyomása van
- felnőttkori légzési distressz szindrómája

Hogy a fenti kontraindikációkat pontosan meg tudjuk ítélni, kérjük a korábbi betegségeiről szóló kórdokumentációt adja át a vizsgálatot végző radiológusnak.

Terhesség:

Az ultrahang kontrasztanyagot nem vizsgálták várandós nőknél. Így a fejlődő magzatra való hatásokat nem lehet pontosan megítélni, de várhatóan nem jelent veszélyt.

Szoptatás:

Ha szoptat, közölje kezelőorvosával. Nem ismeretes, hogy az ultrahang kontrasztanyag átjut-e az anyatejbe.

Egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatás:

Az ultrahang kontrasztanyag és más gyógyszerek között nem jeleztek kölcsönhatást. Ennek ellenére kérjük, jelezze kezelőorvosának, ha jelenleg gyógyszert szed.