




Tájékoztató pacemaker/ICD beültetésén vagy telepcserén átesett betegek részére

Ez a tájékoztató olyan betegeknek szól, akiknél pacemaker/ICD beültetés vagy telepcsere történt. A tájékoztató célja, hogy összefoglalja a műtét utáni legfontosabb teendőket. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy a beültetett készülék mellé kapott betegtájékoztató kiskönyv is fontos információkat tartalmazhat, melynek elolvasása az Ön érdekét és egészségét szolgálja!



Meddig legyen leragasztva a seb?

- A fedőkötés fennhagyása 7 napig javasolt. Ha a kórházi kötszer ragasztása elenged, azt otthoni körülmények között eltávolítani nem javasoljuk. Inkább tanácsos azt gyógyszerárban kapható steril kötszerrel ismételten átragasztani a műtét utáni 7. napig illetve a varratszedésig.
- A sebet **TILOS** bármilyen krémmel vagy kenőccsel kezelni!

Mikor érheti víz a sebet?

- Átfolyó víz 7 nap után érheti a sebet, de azt dörzsölni nem szabad (amíg a pörkők maguktól le nem esnek). Hosszabb időre víz alá menni, a sebet áztatni (pl. medencében) a 6 hetes ellenőrzésig nem javasolt.

Mikor szükséges varratszedés?

- **Felszívódó varrat esetén** varratszedés nem szükséges, de javasolt a fedőkötés fenntartása a műtét utáni 7. napig. Rutinszerű sebellenőrzés általában nem szükséges, kérdéses esetben forduljon családorvosához.
- **Amennyiben sebet nem felszívódó varrattal zárták**, annak eltávolítása a műtétet követő 7. napon javasolt családorvosnál vagy a területileg illetékes sebészeti szakrendelésen (Szegedi lakosok esetén a varratszedés kérhető Pacemaker/ICD járóbeteg-rendelésünkön munkanapokon a délelőtti órákban, melyhez előzetes időpontkérés nem szükséges).

Mi a teendő bevérzés, elszíneződés, váladékozás, láz, duzzanat, erősödő fájdalom esetén?

- A fenti esetekben soron kívüli ellenőrzés javasolt Pacemaker/ICD Ambulanciánkon, melyre javasolt előzetesen bejelentkezni a tájékoztató végén található telefonszámon!
- Az ügyeleti időben jelentkező problémát sürgősségének megfelelően, a területileg illetékes orvosi ügyelet vagy sürgősségi osztályának igénybevételével kell ellátni.

Mennyire lehet a vállat/kart mozgatni?

- A műtét másnapjáig az érintett váll mozgatása kerülendő (az alkar mozgatható).
- Az első héten célszerű a kart kímélni, de nem kell fixen tartani!
- A horizontális sík fölé emelést óvatosan, fokozatosan javasolt bevezetni.

Kontroll vizsgálatok, időpontkérés

- Az első kontrollvizsgálat a zárójelentés végén található időpontban történik, mely a műtétet követő 6. héten esedékes Pacemaker/ICD Ambulanciánkon. Időszakos kontroll vizsgálatok ezt követően előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján zajlanak.
- **Időpontkérés** a tervezett vizsgálat előtt 3 hónappal korábban javasolt - **munkanapokon 10:00-14:00 óráig a 62/341-202-es telefonszámon.**
- A Pacemaker/ICD kontroll NEM helyettesíti a kardiológiai gondozásokon való részvételt. A kardiológiai gondozás minden esetben a területileg illetékes kardiológiai szakrendelőben történik.
- Tervezett eszközös fizioterápia, MRI vizsgálat vagy sugárkezelés előtt kezelőorvosa vegye fel Munkacsoporthunkkal a kapcsolatot!

Soron kívüli kontroll vizsgálat szükséges Pacemaker/ICD Ambulanciánkon:

- Sebbel kapcsolatos probléma esetén;
- ICD működés esetén (egyszeri működés esetén telefonos egyeztetés után tervezett időpontban, többszöri működés esetén azonnal mentőt kell hívni, mely a területi ellátás alapján szállítja a beteget a megfelelő ellátó osztályra);
- A készülék hangadása, rezgése esetén.