


Vérkészítmények ismertetése és indikációik III.

(thr, fvs készítmények előállítása, minőségi jellemzőik, tárolásuk, lejárati idejük)

A vérből előállított készítményekben a tárolás során lezajló változások

Vérkészítmények minőségi jellemzői



Dr. Tápai Katalin
Graduális transzfúziós tanfolyam

Trombocita készítmények

(előállítás, tárolás, tisztítás, indikációk, dózis,
minőség-ellenőrzés, refrakteritás,
mellékhatások)


Fehérvérsejt készítmények

(előállítás, indikáció, mellékhatások)

Trombocita készítmények

Primer hemosztázis

(adhézió /koll., vWill.f, GP IIb-IIIa/,
alakváltozás /korong → gömb/, release,
viszkózus metamorfózis, prokoaguláns felszínek
megjelenése, reverz. majd irreverz. aggr.)
biztosítása



Trombocita készítmények

Előállítás módja:

PRP módszer (ACD-vel savanyítva)

Bc módszer (30 ml pl + 30 ml bc: fvs/thr réteg + 30 ml vvs):

fvs szennyezettség kisebb

TV centrif. erőteljes, bc centrif. gyengébb

Kiadásra: a lejáráthoz közeli „öreg” kész. kerül $\rightarrow T1/2 \downarrow \rightarrow$ heti 2-3x (5-6 donor/alkalom, közel 18 kül. donor kontam./hét)

A/ TV-ből

B/ **Aferezissel:**

gépi: hatékonyabb, **megfelelő tromb. szám és funkció,**

ritkábban kell adni (heti 1x, $T1/2$: 5-7 nap),

friss, 1-2 napos (sz. e. tárolható),

vírusátvitel veszély $\downarrow$ (csak egy donor kontaminál)

HLA-kompat. biztosítható (előre kivizsg-t)

sz.e. szűrhető, fiz. sóban vagy más oldatban reszuszpendálható

tromb. tart-a: $2-5 \times 10^{11}$ /készítmény

vvs-szennyezettség: max. 5×10^9 /kész.

fvs-szennyezettség:

standard: $< 5 \times 10^8$ /kész.

3. gen. afer. (=szűrt min.): $< 1-(5) \times 10^6$ /kész.


térf: 200-400 ml pl v. fiz. só/kész.

tárolás: + 22 °C, rázva

Li: gázáteresztőzsákban 5 nap (zárt rendszer)




Trombocita készítmények/citaferézis



additív oldatban **12024** (20 E: osztható 2 x 10 E, sze. sózható, iradiálható)

Női donor: csak közegcserélve!!

Trombocita előállítás a teljes vér alkotóiból





Trombocita készítmények



00151 16200 16294 **19204 (bc pool)** —————→ **39204**

└───┬───→ 1920**2** f —————→ **39202**

└───┬───→ 19**3**04 sz —————→ **39304** szí

└───┬───→ 1930**2** szf —————→ **39302** szfi

└───┬───→ 193**6**2 szfo → 39362 szfoi

└───┬───→ 193**7**2 szfo → 39372 szfoi

└───┬───→ 193**6**4 szo —————→ **39364** szoi


└───┬───→ 1936**2**szfo —————→ **39362** szfoi

└───┬───→ 193**7**4 szo —————→ **39374** szoi

└───┬───→ 1937**2** szfo —————→ **39372** szfoi

20-30 % benne a plazma

Automatizált thr (19404) előállítás (Tacsi)




Poolozott bc-ból Intersol oldat használatával előállított trombocita készítmény

InterSol oldat
(Thr additív oldat)

Buffy coatok
thr-hez

Octopus
Poolozó szet



Pool zsák

Leukodeple-
táló filter

PL2410
(nem PVC)
Szűrt thr
tárolásához

Trombocita készítmények

túlélés: 2-8 nap ($T_{1/2}$ 7-11 nap)

Tárolás (csakis véradóban): (+ 4 °C: ma már nem ajánlott, 48 óra – jó vérzéscsill., rövid túlélés)

+ 22 °C 5 nap (!) **kivétel: közegcserélt thr** (gyártástól 6 óra)

(7, 9-10 nap, de funkció???, ha a mikrobiol-i monitorozás megoldott)

betegágy mellett (**kiadás után**): **nem tárolható**

– **gyengébb, de megfelelő vérzéscsill.,**

jobb túlélés (de az 5. napos="öreg" → CCI ↓, iv. $T_{1/2}$ felére ↓, tr. igény ↑

csak véradó áll-on, higiénia! (fert. veszély! – bakt., gomba)

rázva – tromb. spontán aggr. kivédésére (ha pH > 7,2 – aggr.)

(rázás hiányában: pH ↓↓, laktát ↑↑)

rázó /agitátor/ gépek: horizontális

billegtető

forgós

„kézzel”

gázátersztő-zsákban: glucose acs. gyors → tejsav + CO₂

(pH ↓: ha pH < 6,2 irreverz. tromb. károsodás) → CO₂ ki, O₂ be

plazmában tároláskor a citokin és C' aktiváció ↑ (exogén citokin → NHLTR)

Fagy-va: - 80, - 90 °C – Li.: 2 év, DMSO,

- 196 °C - Li.: évek, DMSO,

Li.: felov. után max. 24 óra,

visszanyerés max. 40 %,

biol. élettartam norm., tromb. reaktivitás ↓↓,

Dózis 2,5x



Trombocita készítmények

Fagyasztott trombocita

Több egység thr ill. aferézises készítmény fagyasztható le

Fagyasztáshoz szükséges: DMSO (tömény 40 g thr 5 %-nyi ~ 2 ml DMSO)

Tárolás: - 80 °C, Li: ≥ 2 év

- 196 °C - Li.: évek

Felolvasztás (plazma: 35-37 °C vízfürdő

thr: 1-2 perc alatt rázogatva 35-37 °C)

DMSO kimosás (1. 1 : 2 = pl : fizsó

2. a plazma másik felével reszuszp.)

felhasználás azonnal



Fagyasztott thr jellemzői:

Vérzéscsillapító hatás ↓↓

Túlélés megfelelő

Ind: HLA tipizált készítmény igény
autológ

D: 2,5 x

Hosszú tárolhatóság





Trombocita tárolás kapcsán bekövetkező sérülések okai

Az első 100 ml TV-nek a thr-je tönkremegy: ezért kisebb a kinyerése!!!

hideg (a thr a hideget kevésbé szereti, mint a meleget → kinyerés évszaki hatás)

alakvesztés (hidegre, műanyag felületre):

MPV ↓, mikropartikulum ↓,

mikrotubulusok elvesztése

fiziol. vált: Kollagénre adott válasz elhúzódó

P-szelektin expresszió ↑

ATP felszabadulás ↑

biokém. vált: aktin-filamentumok ↓

membrán lipid ↓

I. f. receptorok ↓

műanyag felület

alvadásgátló hatására

Centrifugálás okozta sérülés

Trombin hatására aktiválódik

Mikrovezikuláció → komplement aktiváció → thr aktiváció



Kalcium kiáramlás

Plazmin, elasztán hatására GP Ib/IX degradálódik (↓)

GP IIb-IIIa aktiválódik (↓)

Kalpain hatására a citoszkeleton degradálódik

Hypoxia → tejsav képz → EC pH ↓



Trombocita tároló közeg

1. Composol (**Platetelet additive solution III**), SSP (PAS II) SSP+, PAS+

2. saját plazma (ex. citokin, C' → NHLTR),

Li: az eredeti

(12091 poolozás után: azonnal)

3. AB-s plazma (Li: 6 óra)

ind: vcs. váltás

4. fiz. só (Li: 6 óra) (nincs tápanyag)

ind: **feh. érz.**

X előzetes tromb. tr. után NHLTR

? NAIT (anyai tromb-t fiz. sózva)

IgA hiány → többször mosott tromb.

anafilaxia → többször mosott tromb.

I. mosott vvs

vcs. váltás (nem ABO = tromb.):

?? PAS-ban szuszp-t thr + gyermek, 2 E é/v plazmában szuszp-t thr (2012.06.01.)

(felnőttnél: PAS-ban szuszp-t thr esetén vércsopváltás közegcsere nélkül

0: bárkinek, A: A-snak, AB-snek, B: B-snek, AB-snek 2012.06.01.)


5. albumin (Li: azonnal)

6. idegen plazma





Trombocita készítmények



A nemzetközi gyakorlatban a **thr-t additív oldatban** (70 % PAS + 30 % plazma) tárolják, e módon is megfelelően hatékony thr biztosítható a betegeknek, kevesebb plazma-tart. okozta **kevesebb mh** mellett (de Wildt-Eggen J. et al: Vox Sang. 84.4.256-264.2003., Ringwald J. et al: Transfus. Med. Rev. 20.2.158-164.2006. Cardigan R. et al.: Vox Sang. 94.103-112. 2008.)



Előnye:

plazma feh. tart. ↓

(mh: all., NHLTR, AB0 inkomp.↓, de vCJD kockázat nem)

van der Meer P.F.: Transfusion Clinique et Biologique 14. 522-525. 2007.:

allergiás reakciók előfordulása:

plazmában tárolt thr: 12%

PAS2-ben tárolt thr: 5,3%




Trombocita additív oldatok

típusai:

PAS I

PAS II (T-Sol, **SSP**)

PAS III (Intersol), modifikált: **SSP+**, **Composol**, **PAS+**



Összetétel és hatás: (MPV↑, HSR ↓, ozm.érz.↑ (sérülékenyebb), pH ↑, thr túlélés ↓


Citrát: alv. gátlás (min. 8 mmol/l), tejsav képz. ↓

Acetát: thr acs-hez, tejsav képz. ↓, pH-t stabilizálja

Foszfát: glikolizist és tejsav képz-t ↑-i, puffer szerep

Mg⁺/K⁺ (kedvezőbb): thr aktivációt ↓-i (CD62P expressziót gátolja), annexinA 5 kötés ↓, tejsav képz. ↓, thr morfológiai vált-t fékezi

Na-klorid



SSP (Na-citrát, Na-acetát, Na-klorid, pH: 7,2)

Composol (PAS III): Na, K, Mg, Cl, citrát, acetát, glukonát
pH: 7,0-7,4

(veseelégtelenségben metabolikus alkalózist okozhat)
in vivo **jó haemostaticus aktivitás**



Zhang J.G. et al.: Vox Sang. 94.4.299-305. 2008.:

PAS-thr esetén az **MPV** ↑, **pH: 7,24**


HSR enyhén ↓ (ozm. érzékenység↑)

CD62 expressió, P-selectin↑ → thr aktiv. ↑





Trombocita készítmények



**Minden újabb eljárás az alap készítménnyel
→ a thr funkciót rontja!: aggregabilitás ↓,
ozmotikus érzékenység ↑**

Közegcserélt trombocita koncentrátum

(thr ↓-és 10-30 %, funkció sérül):

a fehérvérsejtek és vérlemezkék mellékhatásokat okozó termékei:

citokinek, $\text{TNF}\alpha$, IL-1, IL-6, β -tromboglobulin, szerotonin,
PF4 távolíthatók el

Csökkentett térfogatú/tömörített thr ???

(TCH-14, thr ↓-és 10-30 %):

2 E (?) szűrt thr-ből, + P4159 (?) (4x150 ml transzfer zsák)

centrifugálást követően a készítményt 1 órát állni

hagyjuk → savanyodás! (aggr elkerülésére)

Felülúszó plazma átnyomása az egyik üres 150 ml-es zsákba, a homogenizált thr üledékre annyi plazma visszaengedése, hogy a végtermék nettó 25-30 ml legyen

Li: 6 óra





Trombocita transzfúzió



ABO, (Rh D) azonosan adandó:

okai: tromb-án rajta az ABO ag-ek

/ha saját plazmában szuszpendált: ABO-nak megfelelő at/

vvs szennyezettség miatt Rh D is fontos

Eltérés az ABO azonosságtól: PAS-ban szuszp. thr + felnőtt: közegcsere nélkül (2012.06.01.

?? PAS thr+gyermek é/v plazmában szuszp-t: ABO kompat. fiz. sóban szuszpendálva
(Akut életveszély: főcsop. inkomp. tromb. is adható, de csakis fiz. sóban, CCI ↓)

Eltérés az Rh D azonosságtól:

(1 ml a-D IgG 25 E thr-re, 1 E thr-ben ~ 0,5 ml vvs, Mo: 10 ml vvs-re 300 µg a-D IgG)

Rh D neg. rec-nek (szülőképes korú nő) Rh D poz. tromb. adása után 72 órával im.
anti-D IgG inj. adandó im.

Anti-D IgG inj. dózisa: < 10 E → 250 µg

> 10 E → 500 µg

férfi v. gesztációs koron túli nő: Rh-t nem kell figyelembe venni

Beadás előtt: ABO, Rh, adategyeztetés
makroszkópos ell. (swirling)
biológiai próba

tromb. szám

random tromb: $0,4 - 0,8 \times 10^{11}/E$,

afer.: $2 - 5 \times 10^{11}/kész.$

Patogén inakt: Psoralen/mb + UVB
riboflavin + UVB (Mirasol)



Sejtszennyezettség a tromb. konc-ban:

A/ bc módszer esetén:

vvs: $0,5 - 30 \times 10^7/E$ (Rh D szerepe)

fvs: $0,5 - 15 \times 10^7/E$

B/ aferézis módszer esetén:

vvs: max. $5 \times 10^9/kész.$

fvs: standard: $< 5 \times 10^8/kész.$

3. gen. afer. (=szűrt min.): $< 1-(5) \times 10^6/kész.$

Fvs eltávolítása:

A/ leukodepletáló szűrő (laboratóriumi vagy betegágy melletti tromb. leukodepletáló szűrő alkalmazandó)

fvs $< 1 \times 10^6/E$

Ind: I. szűrt (leukodepletált) készítmények ind-i

NHLTR

primer HLA-alloimm.

CMV átvitel megelőzése

Li.: + 22 °C – (SCD-vel eredeti li. de csak a vérellátóban, osztályon 6 óra!,

korai szűrés → exogén citokin képz. megelőzése, NHLTR kivédése)

B/ 3. gen. aferézis géppel nyert tromb. cc. SZÜRT MINŐSÉGŰ



Trombocita készítmények indikációja



Abszolút ind:

vérzés, vagy veszélye (GI, urogen., KIR)

+ amegakaryocytás thrombocytopenia (csv károsodás, citosztat., <50 G/l)

vagy súlyos thrombocytopathia (műtéti előkezelés, utókezelés)

vagy dilúciós thrombocytopenia

thr $< 50.000/\mu\text{l}$ → mikroszkópos ellenőrzés! (manuális, hideg at?)

Preventív ind: $< (5)-10-(20) \times 10^9/\text{l}$ (többször, kevesebbet?)

$< 5-10.000/\mu\text{l}$ „tünetmentes” beteg (nem lázas) + **IC vérzés veszélye**

$< 10.000/\mu\text{l}$ ITP, splenectomy

$< 10-20.000/\mu\text{l}$ láz, sepsis, kemoth okozta csv elégtelenség, extrém anémia, leukocitózis, acut DIC, thr csökkenés fokozódó, aplasia felé tart, szemfenéki bevérzés, scopiák

$< 50.000/\mu\text{l}$ **seb beavatkozás**, invazív beavatkozás (biopsia, foghúzás, lumbal punctio, epidural. anaesth., centralis véna szúrás, masszív tr., GI polipectomia, stb), katéter ki, be

$< 80.000/\mu\text{l}$ hypersplenía, császármetszés, epidurális érzéstelenítés

$< 100.000/\mu\text{l}$ nagy vérzésveszéllyel járó műtét (KIR, szem, májpunctio), politraumatizált

$< 100.000/\mu\text{l}$ tonsillectomia (norm thr szám legyen, thrpenia: $< 100000/\mu\text{l}$)

($<$ = legalább annyi legyen a thr szám)

thr-pathia (NSAID kerülése!)



Trombocita készítmények

tartós tromb-pótlásra szoruló betegnél profilaktikusan: ne!

→ tromb. refrakter állapotot válthat ki!



Kontraindikáció:

thr. ref. + nincs vérzés

általában nem jav: konzumpciós trombopénia:

ITP, TTP, HIT, PTP, HUS, sepsis, DIC


gysz indukálta, vérzés nélküli thr-penia

bypass op. utáni, vérzés nélküli thr-penia

szek. diszfunkció

autoimmun-at: a tr-t thr-t is elpusztítja

kivétel: életveszély!



Thr transzfúzió

BCSH ajánlás 2016.12.23.

Restrictiós elv

Nem jav: consumptiós thr-penia, működési zavar

Glanzmann thrombasthenia ha nem hat a th

DIC profilaxis nem jav

TTP kontraindikált, súlyos vérzés esetén egyéni th (nem afer-t!)

ITP, PTP, HIT egyéni

	thr célérték
Reverz. csv elégt/kemoth	$10 \times 10^9/l$
Sepsis, antibiot. th	egyéni
Centrális vénás kanül	$20 \times 10^9/l$
Lumb. punct.	$40 \times 10^9/l$
Máj biopsia	$50 \times 10^9/l$
Seb op.	$50 \times 10^9/l$
Epidurális érzéstelenítés	$80 \times 10^9/l$
Idegseb, szem op	$100 \times 10^9/l$
Politrauma, agy, szem sérülés, spontán IC vérzés	$100 \times 10^9/l$
Súlyos vérzés	$50 \times 10^9/l$
Kp súlyos vérzés	$30 \times 10^9/l$

Imm-tnak X-tt afer-t, ha nincs: random poolozottat

Trombocita transzfúzió

Donor: random (válogatatlan) - eleinte

választott (trombocitaferézis!, hiányában csak=nem keresett, sz poolos thr)

abs. ind: HLA imm. (HLA-at)

tromb. spec. ag. imm. (tromb. spec. at)

tromb. refrakter állapot

csv. trpl. (már az első tromb. cc.)

Thr ea kivizsg ind:

Ismételt NHLTR

Két egymást követő thr CCI elmaradás

Várhatóan tartós thr szubsztitúció (ha imm anamn pozitív)

PTP

Neonat thr-penia

Gysz indukálta thr-penia



Trombocita készítmények dózisa



osztottnál: 10-20 ml/kg 10-20 ml/kg/óra

Aferezises: $0,5 \times 10^{11}$ tromb./ tskg (0,5-1 kész/felnőtt)

(felnőtt dózis: 3×10^{11} thr = 1 db 4 E-es thr cc)

Random: 10 tskg-onként 1 E TV-ből (4E/testfelület m²) 4E pool/70 kg

1,5-2x D: ha a tromb. pusztulás ↑ (sepsis, DIC),
splenomegalia

2,5x D: fagyasztott kész.

(kívánt thr szám – jelenlegi thr szám) x BV
min. D = $\frac{\quad}{\text{RF}}$

BV (beteg vérvolumen) = testfelület m² x 2,5

RF (lép korrekciós faktor) = 0,67

Trombocita transzfúzió gyakorisága

Pandey S. et al: Transfusion S 52. 65S-79S. 2012.

Mc Cullough J: Transfusion Medicine 3th edition 238-304. 2012.:

Többször kevesebbet

(beavatkozás előtt 1-2 órával)

Vérzéskockázat, gyakoriság nem különbözik:

thr szám 5.000-10.000 – 80.000/ μ l között

Endothel integritás megőrzéséhez 7000/ μ l thr elegendő

(EF: thr 9 %-kal ↓, vérzési idő 60 %-kal ↑)



TV → bc → 1 E thr: $0,7 \times 10^{11}/l$

thr ↑ felnőttben: 5-10.000 / μ l → 4x → 20-40.000 / μ l

CF: $4 \times 10^{11}/l$ → thr ↑ → 40.000 / μ l

Trombocita transzfúzió

Hatékonyság ell.:

Th-ás tromb. dózisa: tromb. szám 30-60 G/l-rel ↑
klin-ai tü-k (vérzés ↓ v. megszűnik)



CCI (korrigált inkrement)

Poolozott kész.:

$$\text{CCI} = \frac{(\text{tr. u. thr szám G/l} - \text{tr. e. thr szám G/l}) \times \text{testfel. m}^2}{\text{beadott E-k száma}}$$

norm: 1 órás CCI > 5 G/l

aferézis kész.:

$$\text{CCI} = \frac{(\text{tr. u. thr szám G/l} - \text{tr. e. thr szám G/l}) \times \text{testfel. m}^2}{\text{kész. thr száma (x } 10^{11})}$$

norm: 1 órás CCI > 7,5 G/l

24 órás CCI > 4,5 G/l

Százalékos visszanyerés (percent platelet recovery=PPR)

$$\text{PPR} = 100 \times \frac{(\text{tr. u. thr szám G/l} - \text{tr. e. thr szám G/l}) \times \text{vérvolumen (l)}}{\text{beadott E-k száma} \times 10^{11}} \quad \%$$

1 órás > 20 %, 16-24 órás > 10 %



Trombocita minőség ellenőrzési vizsgálatok

In vitro

thr szám

aggregáció*

hipotóniás shock

pH (6,4-7,4)

morfológiai score

thr GP-k

Készítmény típus	n	Térfogat (ml)	Vvs $\times 10^{12}/E$	Fvs $\times 10^9/E$	Tromb. $\times 10^{11}/E$	pH
4 E egyedi thr-ból poolozva pl	127	260,52	0,0130	0,050	3,31	7,04
4 E buffy coat poolozásából pl	184	179,08	0,0045	0,033	1,89	7,44
4 E bc-pool SSP	72	277,4	0,0041	0,011	2,31 !sz!	7,46
trombocita ferézis	100	241,09	0,0040	0,001	3,77	7,21

β -tromboglobulin (α -granulumban, thr aktiváció),

P-szelektin (granuláris membrán protein, α -granulumban, adhézió,

kimutatható a véralvadékban, aktivált thr és endothel sejtek felszínén)

swirling (37/2000/III.23./ Korm. Rend. 10.fejezet, 12.rész, 28.pont)

*: adrenalin, kis cc-jú ADP, aggrisztin: KF, kollagén, trombin: EF

thr-, idő-, munka-, eszköz-, költség-igényes


Shah Usman et al: Curr. Op. In Hematology 6.4.13-18.2007.



In vivo

CCI

izotópos thr kinetika

vérzésidő (bár szenzitivitása, specifitása kicsi: Peterson P. et al: Arch. Surg. 133.134-9.1998.)





PAS-pool
(Composol)
szűrt thr
vérzés-
csillapító
hatás, klinikai
hatékonyság

~
CF (pl-s)

(Intersol!
v
SSP)

Mh-t nem
jelentettek



Trombocita készítmények

Hatékonyság: mindig az adott típusú készítménytől függ, azt kell értékelni

th-ás thr dózisra: thr szám 30-60 G/l-lel ↑

klinikai tünetek: vérzés ↓ v. megszűnik

CCI

friss készítmény: 12-14 G/l

5 napos + 22 °C-os: 5-7 G/l (poolozott: 1 órás CCI > 5 G/l

aferézis: 1 órás CCI > 7,5 G/l, 24 órás CCI > 4,5 G/l



Vérzéscsillapító hatás függ: a készítmény korától,
típusától,
a beteg állapotától

Vérzéscsillapító hatás fordítottan arányos a thr túléléssel



Trombocita refrakteritás: aferézises thr esetén ritkább
tárolás előtti szűréskor ritkább

nem imm.


imm.

Alloimm/thr refrakteritás megelőzése:

donorszám ↓

leukodepléció (fontosabb, mint a donorszám)

UV: ly életképesség károsítás, thr alloantigenitás, alloimm ↓



NHLTR: thr-nél gyakoribb, mint vvs-nél
ritkább aferézises thr-nál
tárolás előtti szűréskor





Trombocita refrakter állapotok

Def: megfelelő menny-ű, jó min-ű, két egymást követő tromb. tr. után nincs tromb. szám
↑(CCI 1 órás), vérzési idő ↓ v. klin-ai vált. (gyakoribb poolozott thr után,
ritkább aferézises trh tr után)


CCI elmaradásának okai:

Nem imm-i:

láz, fert. (malária is), sepsis, splenomegalia, gysz (acetil-szalicilsav)
antibiotikum (amfotericin B, vancomycin, ciprofloxacin, sumetrolim, Bactrim)
masszív vérzés, DIC, AI bet: SLE, ITP
heparin hatás

Imm-i:

HLA-at (> 90%)
tromb. spec. at. (< 10 %)
ABO maior inkompat.
egyéb at (auto, gysz okozta)



Immun eredetű tromb. refrakter állapot esetén a teendő:

választott (vvs, fvs-HLA-I. oszt., tromb. vonalon, Immucor Capture P), szűrt/szűrt
minőségű HLA-kompat. egyedi **afer.** tromb. kész.

(hiányában: csak= nem keresett, sz poolozott thr alkalmazható)
(sz. e. HLA-identikus tromb., bár sokszor a HLA-kompat. jobb)

Megelőzése: preventív tromb. pótlás kerülése, első tr-t is szűrt készítménnyel!



Trombocita készítmény okozta mellékhatások



Fertőzés átvitel

(vírus: HIV, HCV, HBV – ablakperiódus,
fvs-asszociált: EBV, CMV /szűrt kész. kivédi/, HTLV-I/II. ,
bakt. ← + 22 °C!)

Imm. (HLA-I.→sec. imm., tromb. spec. ag., - PTP, ABO),→ tromb. refrakter állapot

TRALI ↔ PAS (donor HLA/gr. at. rec. fvs ag. ellen, biol. aktív lipidek, gyull. citokinek,
donorok közötti inkomp., ill. rec at donor fvs ag ellen l. 4760-nál)

tr. után 1-6 órán belül súlyos hypoxia, cyanosis, RR ↓, tachycardia, láz, kétoldali
tüdőelvált, nem cardiogen tüdő oedema (Ddg: keringés túlterhelés, szívelégt.)

női donor thr-je csak additív oldatban (**plazmája 18600!**)

Williamson et al.: Transfusion 47. 1455-1467. 2007.

JELENTENDŐ

Rtg: ARDS-szerű



NHLTR : A/ fvs, tromb. at.

B/ tároláskor C' ↑,

exogén citokinek - korai fvs-mentesítéssel kivédhető

C/ Endogén citokinek

Ism-t előford. → tromb. szerol. (HLA, tromb. at. keresés), ha poz. →
választott, afer., szűrt/szűrt min-ű tromb. (sz. e. fiz. sózva)



Allergia, anafilaxia (pl. feh. ag. elleni imm., IgA hiány) → th: fiz. sós tromb.

Trombocita készítmény okozta mellékhatások

TA-GVHD

(megelőzés: irradi. - γ sug., 30-50 Gy, Li: azonnal

ind: congen. v. szerzett ID

csvtrpl. váró/átesett

nagy dózisú kemoth.

iu. tr.

koraszül.

HLA-kompat. kész.

vérokon: imm.kompetensben is, ha a donor, rec. egyik HLA

haplotípusa homozigóta v. a kész. HLA kompat.

vérokon, leendő csv/össejt-donor kerülése)

Szűrés $\neq$ irradi.!

PTP: HPA-1a at. (plazma is kiválthatja!)

tromb. (vagy más, thr-t is tartó vérkész.) tr. után 1 héttel saját tromb. is pusztul
(sajáttal keresztreakáló at.)

Tromb. pótlás jövője: human tromb. membrán preparátum
thrombopoietin

Tromb pótlás alternatívája

A. thrombopoietin (TPO): (Szeged, 1958 . Acta Haematol.,20:350-355.

Kelemen E., Rák K., Tanos B.,
Cserhádi I., Krizsa F., Vezendi K.)

hatása: tromb. szám, méret, vastagság ↑,
megakariocita colonia stimulálás (diff., prolif.) + potenciálás
(érlelés)

a/ rHu-TPO (rec-kötő és karboxiterm. domain is rajta)

b/ PEG-rHuMGDF (megakariocita növ. f.): csak rec. kötő (aktív)
domainje van, PEG-gel konjugált, stabilizált

Mh: trombocitózis
TPO-at

c/ IL-11: megakariocita proliferációt és érést serkenti

B. human tromb. membrán preparátum (thr adhéziót serkenti)



Fehérvérsejt készítmények

Fehérvérsejt készítmények

Adása kerülendő:

agranulocitózisban (kemo., radioth) adandó, de akkor granulocita-pótlásra van szükség

a teljes vér nem tartalmaz nagy menny-ű gr-t:

a gr. ún. marginális poolban (máj, lép, csv) és nem a perifériás vérben (nem a TV-ben)

TV-ből nyerve 20-40 főtől csop. azonos friss vér kellene

a gr. szám ↑ a perif-n: láz, fert.

stressz

fiz-i terhelés

steroid

a TV adásakor a donor nem lehet lázas, fertőzőbeteg, stb. és a TV adását nem előzi meg steroid adása sem

a gr. T1/2: 6 óra → ennyi idő alatt kellene a TV-t feldolgozni, kivizsgálni, a kész-t tr-ni (csak a kivizsg. idő > 24 óra)

fvs tr-nak súlyos mh-ai vannak (l. később, ill. TV)
van hatásos G-CSF, GM-CSF

ha a gr. adás elkerülhetetlen:

granulocitaferézisből legyen:

a donor előtte G-CSF-t (Neupogént ne: mh lépruptura!!) v. steroidot kap
(steroid mh-ai!),

donor kivizsg. az aferézis előtt,
a beadás 6 órán belül megoldható

Fvs-előállítás módja:

1. TV: A/ bc (gr. és tromb. egyidejű pótlására)

B/ bc ülepités (HES):

direkt (2 bc: 1 HES, folyamatos lenyomás)

indirekt (tromb. maradékából, HES-sel, mint direktnél)

2-4 vagy több egység bc poolozása + HES, kb. 200 ml

fvs: kb. 1×10^9 /E x a pool tagok számával

terápiás dózis: 20 E



2. aferézis (granulocitafer.): **CSAKIS!!!**

(kézi)

gépi: hatékony dózis ($> 1 \times 10^{10}$ / kész.),

funkcionáló gr., 8-10 liter vér feldolgozásával

egy donor (steroid v. G-CSF)

vvs-szennyezés jelentős (ABO, RhD azonosan)

granulocitaferézisből (+ irradiált):

a donor előtte G-CSF-t

(Neupogént ne →mh: lépruptura!)

v. steroidot kap (steroid mh-ai!),

CMV-szeronegatív donortól (tilos leukodepletálni)

a beadás akár 6 órán belül megoldható



(POOLOZOTT ELŐÁLLÍTÁS FOG ELŐTÉRBE KERÜLNI? GIN study: Massey E, Transfus Med 2012)

3. (történelmi: CML nyugvó std.)



Fehérvérsejt készítmények

ABO, Rh (D) azonosan adandó (magas a vvs-szennyezettsége) (+thr is szennyezi)

D: $1-2 \times 10^{10}/m^2/nap$

Adagolás: naponta többször (gr. T1/2: 6 óra),
kis dózisban 3 – 4 - 7 napig (filter nélkül!!),
lassan: $10^{10}/óra$

tárolás: + 20-24 °C (mozgatás nélkül), Li: 24 óra

A keringésben a tr-t gr-k ~ 50 %-a jelenik meg, eltűnés 7-8 óra múlva
(T1/2: 6 óra)



Fehérvérsejt / Granulocyta transfúzió



Ind: abs. gr. szám < 500/ μ l (agranulocitózis, csv elégtelenség okozta súlyos citopenia, neutropenia várható ideje > 10-15 nap)

Gram neg. vagy poz. sepsis/gombás fert. + széles spektrumú antibiot./antimik. reziszt. (> 2 nap) + csv elégt. reverz., GCSF-re nem reagáló neutropenia, hatástalan IVIG (és a gr.recovery nem várható < 5-7 nap)
granulocyta funkció súlyos zavara:

újszülöttkori szepszis

chr. granulomás bet. (NADPH oxidáz hiánya, funkciózavar)

Meggondolandó: kezelésre rezisztens hematológiai beteg
lélegeztetett beteg
ismert HLA-alloimmunizáció esetén



1966-2006. között 66 gyermek gr tr-jának tapasztalatai:

7 betegnek profilaktikusan, 59-nek terápiásan adták (ind: főleg Gr. neg. bakt. szepszis, és gombás fert.)

Mh: beteg: tüdő szöv., all., CMV átvitel

donor: főleg influenza-szerű tünetek

van de Wetering MD. et al: Eur. J. Cancer. 43.14.2082-92.2007.



Fehérvérsejt / granulocyta transzfúzió kockázata

Seidel M.G. et. Al.: J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2009.31.166-172.:
59 beteg, 778 (!) gr. tr. mh-ok: **láz, hidegrázás,
tüdőszövődmények**

Quillen K. et al: Haematologica 2009.94.1661-1668.:
1997-2007. között 32 AA-s beteg gr-tr-ja: ind: invasiv gomba-fert
25 %-uknál **HLA-imm. , túlélés: 58 %**



Fehérvérsejt készítmények



Mellékhatásai:

1. **Korai** tr. reakció: láz, hidegrázás (NHLTR)

ARDS (rec. at. donor fvs ag. ellen, vazoaktív anyagok, C' akt.)

allergia

sec. imm.



2. **Késői** tr. reakció: vírus átvitel (CMV, EBV, HIV, hep. v-k)

imm.: HLA, ABO, leuk. ag.

tromb. refrakter állapot, PTP

TA-GVHD (megelőzése: irrad. → T-ly mitóziskép. ↓)



Leukopenia th-ja

A SORREND FONTOS !

1. dekontamináció (bőr, nyh, kórterem, étel-miszer)
2. G-CSF (Neupogen, Granulocyte, bakt.)
v. GM-CSF (Leukomax, bakt.+gomba, gr.+mf)
3. antibiot. + antimikot.
4. HD-IVIG
5. supportiv th: gépi gr-ferézis