



## SZTE SZAKKÖRÖK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

igazgató: Prof. Dr. Dr. Piffkó József egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tel.: (+36) 62 561 378 Fax.: (+36) 62 561 340

E-mail: [office.maxillo@med.u-szeged.hu](mailto:office.maxillo@med.u-szeged.hu) Honlap: [www.maxillo.u-szeged.hu](http://www.maxillo.u-szeged.hu)



### Betegtájékoztató fogeredetű szájüregi/ nyaki tályog sebészi feltárásáról

#### ***Kedves Betegünk!***

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy betegségéről és a műtétről, melyet gyógyulása érdekében ajánlunk, megszerezze a műtéti bejegyzéshez szükséges ismereteket. A beavatkozást végző orvos szóban is fel fogja Önt világosítani. Amennyiben azt követően is úgy érzi, hogy betegségével, vagy az ajánlott kezelés módjával, a várható eredményekkel, az esetleges hátrányos következményekkel és kockázatokkal kapcsolatban további részletek tisztázása szükséges, kérjük, feltétlenül kérdezze meg kezelőorvosát.

#### **Anatómiai és élettani ismeretek**

A fogbél bakteriális gyulladása a csontból kifelé törve a csontthártyát is elérheti. Ez helyileg vagy a szájnyálkahártya, vagy a bőralatti lágyrészek felé terjedhet tovább, és ha körülírttá válik, akkor gennyel teli üreg alakul ki. Némely esetben a gyulladás a nyakizmok hárttyája mentén a nyak mélyebb részei felé is terjedhet, és tályog, vagy a lágyrészek lapszerinti gyulladása alakulhat ki. Súlyosabb esetekben, a betegség a nyakról a mellkas üregébe is beterjedhet, ami életveszélyes, és néha még napjainkban is halálos szövődmény kialakulásához vezethet.

#### **A műtét elvégzését indokló tényezők**

A gyulladás megszüntetéséhez a felgyülemlett gyulladással járó izgalmat (genny) eltávolítására és antibiotikus kezelésre van szükség.

#### **A műtét menete, a beavatkozás rövid leírása**

Ha a gyulladás csak a szájnyálkahártya alatti részekre korlátozódik, akkor a tályog szájüregi megnyitása és az érintett fog eltávolítása elegendő. Helyi, vagy általános érzéstelenítésben a tályog legnagyobb domborulatán metszést ejtünk, majd a váladékot lebocsátjuk. Az üreget fertőtlenítő tartalmú oldattal többször átöblítjük, majd az üregbe jódtartalmú fertőtlenítővel átitatott gézcsíkot, vagy a váladék levezetéséhez kis gumicsövet helyezünk. A műtétet követően az üreg ismételt átöblítését végezzük a gyulladással járó jelek megszűnéséig.

A nyaki tályog megnyitása a nyak felől, a bőrön ejtett metszéssel keresztül, legtöbbször az alsó állcsont alatti területen, az előbbieknél leírt módon történik.

#### **Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei**

A műtétet helyi érzéstelenítésben vagy általános érzéstelenítésben (altatásban) végezzük, ennek mellékhatásairól és lehetséges szövődményeiről az altatást végző orvos külön tájékoztatja.

#### **Általános műtéti kockázat**

A műtétek általános veszélyei, mint a trombózis, embólia, sebfertőzés, keringési reakciók egészséges egyénben ritkák. A műtét kapcsán elvégzett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek, infúzió bekötése, központi viszérkatéter behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során környéki idegsérülést okozó nyomási károsodás, a nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés, lézersugár használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek.



## SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

igazgató: Prof. Dr. Dr. Piffkó József egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tel.: (+36) 62 561 378 Fax.: (+36) 62 561 340

E-mail: [office.maxillo@med.u-szeged.hu](mailto:office.maxillo@med.u-szeged.hu) Honlap: [www.maxillo.u-szeged.hu](http://www.maxillo.u-szeged.hu)



### Betegtájékoztató fogeredetű szájüregi/ nyaki tályog sebészi feltárásáról

#### A műtét lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei

A kezelés sikerességét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem garantálhatja, de a legnagyobb gondossággal és szakszerűséggel végezzük a beavatkozást.

Nagyon ritkán előfordulhat ideg és érsérülés is.

A gyulladás tovaterjedhet a mellüreg felé, ami mellkas sebészeti beavatkozást tehet szükségessé.

A nyaki bőrmetszés helyén mindig heg marad vissza, a szájból végzett metszéseknél ez nem okoz esztétikai problémát.

#### Közvetlenül a műtét után előforduló jelenségek

A műtéti terület duzzanata a beavatkozást követő napon már lényegesen csökken, a váladék mennyisége napról napra kevesebb lesz.

A műtétet követően az üreg ismételt átöblítését végezzük a gyulladáscsökkentő jelek megszűnéséig.

A gyulladás megszüntetéséhez antibiotikum szedése is elengedhetetlen (visszérbe adott injekció vagy tableta). Amennyiben a gyógyszert vénás injekció formájában kapja, akkor általában pár napos kórházi ápolás is szükséges.

A műtét utáni fájdalom csillapítására a gyógyszertárakban kapható egyszerű fájdalomcsillapítók (Algopyrin, Cataflam, Demalgon) általában elegendőek.

#### A műtét utáni magatartási szabályok

Javasolt a szájüreg tisztán tartása, valamint a szájnityás gyakorlása.

A gyógyulóban lévő tályog utókezelése ambulánsan, járóbetegként is történhet, erről a lehetőségről kezelőorvosa külön tájékoztatja.