



SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

igazgató: Prof. Dr. Dr. Piffkó József egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tel.: (+36) 62 561 378 Fax.: (+36) 62 561 340

E-mail: office.maxillo@med.u-szeged.hu Honlap: www.maxillo.u-szeged.hu

27. sz. betegtájékoztató



Betegtájékoztató az orrcsonttörés műtéti helyreállításáról

Kedves Betegünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy betegségéről és a műtétről, melyet gyógyulása érdekében ajánlunk, megszerezze a műtéti beleegyezéshez szükséges ismereteket. A beavatkozást végző orvos szóban is fel fogja Önt világosítani. Amennyiben azt követően is úgy érzi, hogy betegségével, vagy az ajánlott kezelés módjával, a várható eredményekkel, az esetleges hátrányos következményekkel és kockázatokkal kapcsolatban további részletek tisztázása szükséges, kérjük, feltétlenül kérdezze meg kezelőorvosát.



A műtét elvégzését indokló tényezők

Az orrcsont és az orrsövény törései az orrot ért tompa erőbehatások következtében alakulhatnak ki. A sérülés következménye az orr elferdülése, vagy az orrhát besüppedése lehet. Az orr lágyrészei megduzzadhatnak, vérömlenyek keletkezhetnek az orrháton és a szemkörüli területen (ez az ún. pápaszem, vagy monokli bevézés). Az orr nyálkahártyájának átszakadásakor változó erősségű orrvérzés is kialakulhat.

Az orrnyálkahártya megduzzadása, valamint az orrsövény törésének következtében kialakult vérömleny akadályozza a normális orrlégzést és szaglást. Mivel a sérülés következtében az orr alakja deformált és működése is gátolt (a belélegzett levegő nedvesítése, tisztítása akadályozott) ezért a sérülés után minél előbb tanácsos az orr alakjának a kiegyenesítése, az orrjáratok átjárhatóságának biztosítása. Amennyiben ezek a sérülések nem kerülnek megfelelő ellátásra, akkor a külső orr maradandó torzulása mellett az orrlégzés akadályozottsága miatt az orrmelléküregek, a garat, a légcső, valamint a középfül területén, akár maradandó hallászavarral is járó krónikus gyulladások fejlődhetnek ki.

A műtét menete, a beavatkozás rövid leírása

Az orrcsont törései az első napokban külön külső metszés nélkül az orrüreg felől helyreigazíthatók. Az orrsövény nagyobb fokú törései és vérömlenyei esetében az orrüreg felől végezzük el a korrekciót. A törtvégeket eredeti helyükre igazítjuk, majd belső orrtamponálással ill. szükség esetén az orrhátra helyezett külső gipszsínnel rögzítjük azokat. A műtét helyi, vagy általános érzéstelenítésben végezhető el.



Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei

A műtétet általános érzéstelenítésben (altatásban) végezzük, ennek mellékhatásairól és lehetséges szövödményeiről az altatást végző orvos külön tájékoztatja.

Általános műtéti kockázat

A műtétek általános veszélyei, mint a trombózis, embólia, sebfertőzés, keringési reakciók egészséges egyénben ritkák. A műtét kapcsán elvégzett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek, infúzió bekötése, központi viszérkatéter behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során környéki idegsérülést okozó nyomási károsodás, a nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés, lézersugár használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek.



SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

igazgató: Prof. Dr. Dr. Piffkó József egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tel.: (+36) 62 561 378 Fax.: (+36) 62 561 340

E-mail: office.maxillo@med.u-szeged.hu Honlap: www.maxillo.u-szeged.hu

27. sz. betegtájékoztató



Betegtájékoztató az orrcsonttörés műtéti helyreállításáról

A műtét lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei:

A kezelés sikerességét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. A műtéti beavatkozás általános veszélyei, mint pl. fertőzések, trombózisok (vérrögképződés), embóliák (leszakadt vérrög okozta verőér elzáródás), szervek, vagy erek melléksérülései - az orvostudomány haladásának köszönhetően - ritkábbá váltak. Ma többet is tudunk tenni ellenük, mint régen.

Közvetlenül a műtét után előforduló jelenségek

Az orrsövény bevérvése és vérömlenye következtében esetlegesen kialakuló tályog újabb beavatkozást tehet szükségessé. Erősebb utóvérvések ritkán fordulnak elő és rendszerint tamponálással jól kezelhetők. Az orrhát és az arc lágyrész duzzanatai legtöbbször néhány napon belül megszűnnek.

Várható eredmények

Az orrcsont és orrsövény sérüléseit követő helyreállító beavatkozások általában jó kozmetikai eredményhez vezetnek. Néhány esetben a külső orr alakja deformált maradhat, vagy az orrlégzés akadályozott lehet, különösképpen, ha már régebbi alakváltozások is léteztek. Ezek az elváltozások azonban a későbbiek folyamán plasztikai sebészeti beavatkozásokkal megszüntethetők.

A műtét utáni magatartási szabályok

A beavatkozást követően az orrüregeket tamponáljuk. A tamponon kevés véres-savós váladék szivárog át, mely normálisnak tekinthető. Hogy a váladék az orrkörnyéki bőrt ne marja fel, célszerű enyhén zsíros krémmel az orrbemenet bőrét bekenni, valamint ún. parittyá-kötést felhelyezni, majd az átnedvesedést követően szárazra cserélni. Az orrlégzés akadályozottsága miatt szájon keresztül történik a légzés, ennek következtében a száj- és garatnyálkahártya gyakran kiszárad. Kevés folyadék gyakori fogyasztásával ez a kellemetlenség mérsékelhető. A műtét utáni fájdalom csillapítására a gyógyszertárakban kapható egyszerű fájdalomcsillapítók (Algopyrin, Cataflam, Demalgon) általában elegendőek. Ha orrában erős, lüktető fájdalmat érez, nagyfokú duzzanatot észlel, láz lép fel, azonnal keresse fel osztályunkat. Tamponeltávolítást követően az orrnyálkahártya gyakran kiszárad. A pörkök fellazítása érdekében a kezelőorvos által javasolt orrkenőcsök és olajok rendszeres használata szükséges egy ideig. Kerülendő az orr piszkálása és erőltetett kifúvása. A teljes gyógyulásig, mely általában több hétig tart, lehetőség szerint kerülje a meghűlést, a fizikai megerőltetést és ne menjen strandra, uszodába.

A megbeszélte ellenőrző vizsgálatokon - utókezeléseken akkor is feltétlenül jelenjék meg, ha panaszmentesnek érzi magát!