



## SZTE SZAKK ÖRÖK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

igazgató: Prof. Dr. Dr. Piffkó József egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tel.: (+36) 62 561 378

Fax.: (+36) 62 561 340

E-mail: [office.maxillo@med.u-szeged.hu](mailto:office.maxillo@med.u-szeged.hu)

Honlap: [www.maxillo.u-szeged.hu](http://www.maxillo.u-szeged.hu)

## 2. sz. betegtájékoztató



### Betegtájékoztató az arcüreg műtéti feltárásáról

#### **Kedves Betegünk!**

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy betegségéről és a műtétről, melyet gyógyulása érdekében ajánlunk, megszerezze a műtéti beleegyezéshez szükséges ismereteket. A beavatkozást végző orvos szóban is fel fogja Önt világosítani. Amennyiben azt követően is úgy érzi, hogy betegségével, vagy az ajánlott kezelés módjával, a várható eredményekkel, az esetleges hátrányos következményekkel és kockázatokkal kapcsolatban további részletek tisztázása szükséges, kérjük, feltétlenül kérdezze meg kezelőorvosát.

#### **Anatómiai és élettani ismeretek:**

A felső állcsontban lévő fogak gyökerei az arcüreg alsó falához közel helyezkednek el, az üregtől gyakran csak egy vékony csontlemez választja el őket. A gyökércsatornán felterjedő bakteriális fertőzések az arcüreg nyálkahártyájának gyulladását okozhatják (fogeredetű arcüreggyulladás).

#### **Egyéb kezelési lehetőségek (röviden)**

A gyulladásokat kezdetben orrcseppekkel, antibiotikumokkal, a gyulladt fog eltávolításával kezeljük. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a gyulladás meggyógyítása érdekében műtéti megoldásra kényszerülünk.


#### **A tervezett beavatkozás, műtét elmaradásának, visszautasításának lehetséges kockázatai**

A műtét elvégzését indokló tényezők fejezetben leírt tünetek továbbra is fennmaradnak, idővel súlyosbodhatnak.

#### **A műtét menete, a beavatkozás rövid leírása**

Az érintett oldalon a felső fogsor felett a nyálkahártyán kis metszést ejtünk, a lágyrészeket felpreparálva szabaddá tesszük

az arcüreg elülső csontos falát. A szemfog feletti részen, ahol a legvékonyabb a csont, egy kis csontlebenyt és csontablakot képzünk, melyen keresztül távolíthatjuk el a gyulladt nyálkahártyát.



Ezt követően ugyancsak vésővel az orrüreg és az arcüreg közötti válaszfalon is készítünk egy nyílást, majd az arcüreget gézcsíkkal tamponáljuk. A tampon egyik felét az orrüregbe vezetjük ki, ennél fogva tudjuk néhány nap múlva eltávolítani.

#### **Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei**

A műtétet általános érzéstelenítésben (altatásban) végezzük, ennek mellékhatásairól és lehetséges szövődményeiről az altatást végző orvos külön tájékoztatja.

#### **Általános műtéti kockázat**

A műtétek általános veszélyei, mint a trombózis, embólia, sebfertőzés, keringési reakciók egészséges egyénben ritkák. A műtét kapcsán elvégzett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek, infúzió bekötése, központi viszerkatéter behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során környéki idegsérülést okozó nyomási károsodás, a nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés, lézersugár használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek.



## SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

igazgató: Prof. Dr. Dr. Piffkó József egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tel.: (+36) 62 561 378 Fax.: (+36) 62 561 340

E-mail: [office.maxillo@med.u-szeged.hu](mailto:office.maxillo@med.u-szeged.hu) Honlap: [www.maxillo.u-szeged.hu](http://www.maxillo.u-szeged.hu)

## 2. sz. betegtájékoztató



### Betegtájékoztató az arcüreg műtéti feltárásáról

#### A műtét lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei:

A kezelés sikerességét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem garantálhatja, de garantáljuk a legnagyobb gondosságot és szakszerűséget. A műtéti beavatkozás általános veszélyei, mint pl. fertőzések, trombózisok (vérrögképződés), embóliák (leszakadt vérrög okozta verőér elzáródás), szervek, vagy erek melléksérülései - az orvostudomány haladásának köszönhetően - ritkábbá váltak. Ma többet is tudunk tenni ellenük, mint régen.

#### Közvetlenül a műtét után előforduló jelenségek

Az arcüreg műtéti feltárásának ritkán alakul ki szövődménye. Leggyakoribb következmény az arc átmeneti duzzanata. A lágyrészek közé vér szivároghat, ez a bevérzés néhány nap alatt felszívódik és a duzzanattal együtt maradéktalanul eltűnik.

#### Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények

Késői következmény lehet a csontos ablak körüli lágyrész hegesedés miatti enyhe fájdalom, a terület egy ideig tömöttebb tapintatú. A fogsor feletti nyálkahártyametszés vonalában sarjszövetképződés alakulhat ki. Ezek rendszerint vagy maguktól megszűnnek, vagy gyógyszeres kezeléssel gyorsan megszüntethetők és nem igényelnek újabb műtéti beavatkozást.

#### Várható eredmények

A beavatkozással legtöbb esetben jó eredményt érünk el. A gyulladás megszűnésével helyreáll az arcüreg normális funkciója, azonban a panaszok kiújulásának lehetősége nem zárható ki teljesen. Ilyenkor később újabb beavatkozás válhat szükségessé.

#### A műtét utáni magatartási szabályok

A beavatkozást követően az orrüregeket tamponáljuk. A tamponon kevés véres-savós váladék szivárog át, mely normálisnak tekinthető. Az orr környéki bőr felmaródásának megelőzése érdekében célszerű enyhén zsíros krémmel az orrbemenet bőrét bekenni, valamint ún. parittyakötést felhelyezni, majd az átnedvesedést követően szárazra cserélni. Az orrlégzés akadályozottsága miatt szájon keresztül történik a légzés, emiatt a száj- és garatnyálkahártya kiszárad. Kevés folyadék gyakori fogyasztásával ez a kellemetlenség mérsékelhető.

A műtét utáni időszakban a fájdalom csillapítására a gyógyszertárakban kapható egyszerű fájdalomcsillapítók (Algopyrin, Cataflam, Demalgon) általában elegendőek.

Tamponeltávolítást követően az orrnyálkahártya gyakran kiszárad. A pörkők fellazítása érdekében a kezelőorvos által javasolt orrkenőcsök és olajok rendszeres használata szükséges egy ideig. Kerülendő az orr piszkálása és erőltetett kifúvása.

A teljes gyógyulásig, mely általában 3-4 hétig tart, lehetőség szerint kerülje a meghűlést, a fizikai megerőltetést és ne menjen strandra, uszodába.

A megbeszélte ellenőrző vizsgálatokon - utókezeléseken akkor is feltétlenül jelenjék meg, ha panaszmentesnek érzi magát!